⇐ <<GAUSS>> ⇒

SOMMARE i primi 100 numeri naturali: $\left\{\sum_{i=1}^{100} i\right\}$ da GAUSS

1, 2, 3, 4, ...	98, 99,	100	+
100, 99, 98, 97, ...	3, 2,	1	=
101, 101, 101, 101, ...	101, 101,	101	—

$\Rightarrow S_{100} = \frac{101}{2} \cdot 100 = 5050$ (50)

VALIDA PERTANTO LA SEGUENTE: $S_n = \frac{a_1 + a_n}{2} \cdot n$, che applicata alle

PROGRESSIONI GEOMETRICHE DI RAGIONE (r):

$a_1 \quad a_2 \quad a_3 \quad \ldots\ldots \quad a_n$

3, 6, 12, 24, 48, 96 ⇒ Esempio di progressione geometrica di ragione (2) fino a a_n con $n = 6 \Rightarrow \Sigma = 189$

$\frac{a_2}{a_1} = r_1 \quad \frac{a_3}{a_2} = r_2 \quad \frac{a_4}{a_3} = r_3 \quad \frac{a_5}{a_4} = r_4 \quad \frac{a_6}{a_5} = r_5$ ⇒ ragione (r) → $3 \cdot 2 + 6 \cdot 2 + 12 \cdot 2 + 24 \cdot 2 + 48 \cdot 2 + 3 = 189$ (a_{n-1}) (a_n)

$L(r_n \cdot q = a_n \cdot r)$ — L(r) — (1)

$\Sigma = a_1 + a_2 + a_3 + \ldots + a_{n-1} + a_n$

$r\Sigma = a_1 r + a_2 r + a_3 r + \ldots + a_{n-1} r + a_n r$

Grazie a Gauss siamo definire una progressione aritmetica a seguente successione:

a: 5, 8, 11, 14 ⇒ r: 3, 3, 3 } in cui la differenza tra qualsiasi termine della successione e il precedente è costante $\neq 0$ e r! ⇒ $a_3 = 11 - 3 = 8$ come faceva Gauss $8+3=11$ (ovvero a_{k+1})

Applicando la progressione aritmetica alla (1), otteniamo:

$\Sigma \Rightarrow a_1 + a_2 + \ldots + a_{n-1} + a_n$ (−)

$r\Sigma \Rightarrow 1 \cdot a_1 + \ldots + r a_{n-1} + r \cdot a_n$ ($r \cdot a_n$)

$= a_1 - a_n \cdot r$

$\Rightarrow \Sigma - r\Sigma = a_1 - r_n \cdot q \Rightarrow \Sigma - r\Sigma = a_1 - r_n \cdot q$

$\Rightarrow \Sigma(1-r) = a_1(1-r_n) \Rightarrow$

$\Sigma = S_n = \frac{a_1(1-r_n)}{1-r} = a_1 \cdot \frac{(1-r_n)}{1-r}$

$\left[a_{10} = r_1 + r_2 1 - r_n \Rightarrow \frac{1-r_n}{1-r} \cdot a_1\right]$